

带状疱疹ワクチンについて

種類	生ワクチン (乾燥弱毒生水痘ワクチン)	不活化ワクチン (乾燥組換え带状疱疹ワクチン)
助成回数	1回のみ	2回まで
助成上限額	4,000円/回 ※接種費用が4,000円未満の場合はその額	10,000円/回 ※接種費用が10,000円未満の場合はその額
接種回数	1回	2か月間隔で2回
接種方法	皮下接種	筋肉内接種
接種料金	医療機関ごとに異なるため、自己負担が発生します。	
予防効果	<ul style="list-style-type: none"> ●発症予防効果：中程度 50～59歳：69.8% 60歳以上：51.3% ●带状疱疹後神経痛予防効果：中程度 60歳以上：66.5% ●長期予防効果：低い 1年目：67.5% 2年目：47.2% 8年目：31.8% 	<ul style="list-style-type: none"> ●発症予防効果：非常に高い 50歳以上：97% 70歳以上：91% ●带状疱疹後神経痛予防効果：非常に高い 70歳以上：85.5% ●長期予防効果：高い 50歳以上で、10年以上の予防は80%を超える
副反応	<ul style="list-style-type: none"> ●副反応の発症率は、不活化ワクチンより低い ●頻度10%以上の副反応 発赤(44.0%)、搔痒感(27.4%)、熱感(18.5%)、腫脹(17.0%)、疼痛(14.7%)、硬結(13.5%) ●重大な副反応(頻度不明) アナフィラキシー、無菌性髄膜炎、血小板減少性紫斑病 	<ul style="list-style-type: none"> ●副反応の発症率が高い ●頻度10%以上の副反応 疼痛(79.1%)、発赤(37.4%)、筋肉痛(36.9%)、疲労(34.6%)、頭痛(28.3%)、腫脹(24.2%)、悪寒(21.4%)、発熱(16.7%)、胃腸症状(12.0%) ●重大な副反応(頻度不明) ショック、アナフィラキシー
注意点	<ul style="list-style-type: none"> ●他の生ワクチンとは、接種前後27日以上の間隔が必要です。 ●免疫不全・免疫抑制状態の方は、接種できません。 ●妊娠中の方は接種できません。接種後2ヶ月間は、妊娠を避ける必要があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●1回目の接種から2か月間隔をあけて2回目の接種をお願いします。

※出典：ワクチン添付文書、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料