

ワクチンの種類と 助成について		生ワクチン	組換えワクチン(不活化ワクチン)
接種回数(接種方法)		1回(皮下に接種)	2回(筋肉内に接種)
助成額		1回のみ 4,000 円	1回につき 10,000 円(上限 2 回)
接種スケジュール		他の生ワクチン接種 27 日後	通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種 ※病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。
接種できない方		病気や治療によって、免疫が低下している方は接種出来ません。	免疫の状態に関わらず接種可能です。
接種に注意が必要な方		輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方。	筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方。
帯状疱疹後神経痛に対する 予防効果(接種後3年時点)		6割程度	9割以上
ワクチン 接種後 の 予防効果	接種後 1 年時点	6割程度	9割以上
	接種後 5 年時点	4割程度	9割程度
	接種後 10 年時点	—	7割程度
ワクチン接種した部位の 状態 副反応の発現割合	70%以上	—	疼痛
	30%以上	発赤*	発赤* 筋肉痛、疲労
	10%以上	そう痒感*、熱感* 腫脹*、疼痛*、硬結*	頭痛、腫脹* 悪寒、発熱、胃腸症状
	1%以上	発疹、倦怠感	そう痒感*、倦怠感、その他の疼痛

